

patients with type 2 diabetes: an overview of data from PROactive. *Drug Saf* 2009; 32(3): 187–202.

21. Bunck MC, Poelma M, Eekhoff EM et al. Effects of vildagliptin on postprandial markers of bone resorption and calcium homeostasis in recently diagnosed, well-controlled type 2 diabetes patients. *J Diabetes* 2012; 4(2): 181–185.

22. Avogaro A, Schernthaner G. Achieving glycemic control in patients with type 2 diabetes and renal impairment. *Acta Diabetol* 2013; 50(3): 283–291.

23. Groop PH, Cooper ME, Perkovic V et al. Linagliptin lowers albuminuria on top of recommended standard treatment in patients with type 2 diabetes and renal dysfunction. *Diabetes Care* 2013; 36(11): 3460–3468.

24. Gilbert RE. SGLT-2 inhibition in patients with kidney disease. *Diabetes Metab* 2014; 40(6 Suppl 1): S23–S27.

25. DeFronzo RA, Lewin A, Patel S et al. Fixed-dose combinations of empagliflozin/linagliptin for 24 weeks as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes (T2DM) (Abstract). *Diabetes* 2014; 63(Suppl 1A): LB33.

MUDr. Jan Šoupal

✉ jan.soupal@vfn.cz

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

www.vfn.cz

Doručeno do redakce 24. 2. 2015

Přijato po recenzi 13. 3. 2015

Vážení čtenáři,

u článku D. Baláž, A. Komorníková, P. Sabaka, L. Gašpar, A. Dukát. Význam transkutánného monitorovania tkaničkového kyslíka u pacienta s diabetes mellitus s jeho komplikáciami v čísle Vnitř Lék 2015; 61(2) došlo v obsahu na s. 91 nedopatřením k chybě v anglickém překladu článku, který měl správnou podobu **The importance of transcutaneous oxygen tension monitoring in diabetic patient with complications**. Za tuto chybu se Vám i autorům článku omlouváme.

Autoři článku I. Hoffmanová, D. Sánchez. Neceliakální glutenová senzitivita v čísle Vnitř Lék 2015; 61(2) nás požádali o opravu údajů o řediteli pracoviště na s. 219. Správná podoba údajů o pracovišti je **Laboratoř buněčné a molekulární imunologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha, ředitel RNDr. Martin Bilej, DrSc.**

Redakce časopisu