

Tab. 2. Popis kohorty pacientů z hlediska předchozí léčby warfarinem a nové léčby apixabanem, včetně důvodů pro změnu léčby

Popis kohorty z hlediska léčby	n	%/průměr	SD1) (min–max)
Předchozí léčba warfarinem	n	%/průměr	SD (min–max)
Trvání léčba (dny)	430	178,7	81,1 (90,0–365,0)
Ambulantní návštěvy lékaře	430	7,7	4,7 (7,0–29,0)
Ambulantní návštěvy lékaře za posledních 6 měsíců	430	6,7	4,7 (0,0–29,0)
Hospitalizace	27	6,3 %	—
Délka hospitalizace (dny)	27	8,5	4,9 (3,0–21,0)
Krevní transfuze	0	0,0 %	—
Čas od diagnózy (dny)	424	370,7	607,6 (90,0–7645,0)
Počet monitorujících návštěv INR	430	7,8	3,2 (1,0–23,0)
Důvody pro přechod z warfarinu na apixaban	n	%	
INR v rozmezí 2,0–3,0 po méně než 67 % sledování	271	63,0 %	
Nežádoucí příhody	77	17,9 %	
Nemožnost pravidelné monitorace INR	41	9,5 %	
Rezistence na warfarin	21	4,8 %	
Možná interakce s dalšími léčivými	10	2,6 %	
Závažná ischemická příhoda	10	2,6 %	
Nová léčba apixabanem	n	%/průměr	SD (min–max)
Denní dávka (návštěva 1)	430	9,1	2,6 (2,5–20,0)
Denní dávka (návštěva 2)	428	9,0	2,5 (1,0–20,0)
Denní dávka (návštěva 3)	422	9,2	2,4 (1,0–20,0)
Hospitalizace (návštěva 2)	0	0,0 %	—
Hospitalizace (návštěva 3)	0	0,0 %	—
Krevní transfuze (návštěva 2)	0	0,0 %	—
Krevní transfuze (návštěva 3)	1	0,2 %	—
Ambulantní návštěvy lékaře za 6 měsíců (návštěva 2)	428	1,2	0,9 (0,0–11,0)
Ambulantní návštěvy lékaře za 6 měsíců (návštěva 3)	422	1,2	0,7 (0,0–5,0)

Tab. 3. Výskyt krvácení, ischemických příhod a dalších nežádoucích příhod v průběhu léčby warfarinem a v průběhu léčby apixabanem

	Warfarin ¹⁾	Apixaban ¹⁾	
	Návštěva 1 (n = 430)	Návštěva 2 (n = 428)	Návštěva 3 (n = 422)
Závažná krvácení	n (%)	n (%)	n (%)
Žádné	411 (94,9 %)	428 (100,0 %)	419 (99,5 %)
Nitrooční krvácení	5 (1,2 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Pokles hemoglobinu ≥ 20 g/l	5 (1,2 %)	0 (0,0 %)	1 (0,2 %)
Nitrokloubní krvácení	8 (1,6 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Krvácení do peritonea	2 (0,5 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Perikardiální krvácení	2 (0,5 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Nitrolební krvácení	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Intraspinální krvácení	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Transfuze ≥ 2 jednotky krve	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	1 (0,2 %)
Ischemické příhody	n (%)	n (%)	n (%)
Žádné	400 (91,7 %)	427 (99,8 %)	422 (100,0 %)
CMP	17 (3,9 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Srdeční ischemie	11 (2,5 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Systémová embolie	6 (1,2 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Jiné	2 (0,4 %)	1 (0,2 %)	0 (0,0 %)
Další nežádoucí příhody	n (%)	n (%)	n (%)
Klinicky významné nezávažné krvácení	173 (36,6 %)	1 (0,2 %)	1 (0,2 %)
Žádné	82 (17,3 %)	425 (99,3 %)	421 (99,8 %)
Nauzea	85 (18,0 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Jiné	71 (15,0 %)	2 (0,5 %)	0 (0,0 %)
Průjem	36 (7,6 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)
Zvracení	26 (5,5 %)	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)

1) délka předchozí léčby warfarinem byla 3 až 12 měsíců, návštěva 2 byla po 3 měsících léčby a návštěva 3 po 6 měsících léčby apixabanem. Každý pacient mohl mít více než jednu příhodu, procentuální základ je vždy součet daných příhod