

NOVINKA



RAMBUZA

urapidilum



DALŠÍ
PEVNÝ BOD
v léčbě hypertenze

Zkrácená informace o přípravku RAMBUZA. Léčivá látka: urapidilum 30 nebo 60 mg v 1 tvrdé tobolce s prodlouženým uvolňováním. **Indikace:** dospělí: hypertenze. **Dávkování:** doporučená počáteční dávka: 30 mg 2x denně (pro rychlejší snížení krevního tlaku je možná zahajovací dávka 60 mg 2x denně). Dávku je dále možné individuálně upravit do rozsahu udržovací dávky 60-180 mg denně rozdělené do 2 jednotlivých dávek. **Porucha funkce jater; středně těžká a těžká porucha funkce ledvin:** je možná nutnost snížit dávku. **Starší pacienti:** je nutná zvýšená opatrnost a nižší úvodní dávka. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění:** opatření pro použití: při srdeční nedostatečnosti způsobené funkčním poškozením mechanického původu, např. stenózou aortální nebo mitrální chlopně, plicní embolií nebo poruchou srdeční činnosti z důvodu onemocnění perikardu; při současné léčbě cimetidinem. Pacientův oftalmolog má být informován o současné nebo předchozí léčbě alfa 1 blokátory, kvůli možnému výskytu peroperačního IFIS (syndrom plovoucí duhovky). Přípravek Rambuza obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharózo-izomaltázovou deficiencí nemají tento přípravek užívat. Přípravek Rambuza 60 mg obsahuje azobarvivo azorubin (E122), které může vést k alergickým reakcím. **Interakce:** účinek urapidilu může být zesílen současným podáváním torů alfa-receptorů včetně těch, které se podávají při urologických onemocněních, vazodilatátorů a jiných antihypertenziv, stavy s nedostatečným objemem tekutin (průjem, zvracení), alkoholem, kombinací s baklofenem. Kvůli možnému zvýšení sérové koncentrace urapidilu při podávání s cimetidinem je třeba zvážit snížení dávky. Opatrnost při podávání s: imipraminem, neuroleptiky, amifostinem nebo kortikoidy. Není doporučena kombinace s ACE inhibitory. **Těhotenství a kojení:** přípravek Rambuza lze v těhotenství použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu urapidilem. Přípravek Rambuza se během kojení nemá podávat. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** přípravek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, reakce se individuálně liší, zejména na počátku nebo při změně léčby nebo při současném požití s alkoholem. **Nežádoucí účinky:** časté: nauzea, závrať, bolest hlavy. **Velikost balení:** Rambuza 30 mg: 50 nebo 100 tobolek; Rambuza 60 mg: 50 nebo 100 tobolek. **Podmínky uchovávání:** v dobře uzavřené lahvičce, spotřebovat do 50 dnů po prvním otevření lahvičky. **Registrační čísla:** Rambuza 30 mg: 58/1054/16-C; Rambuza 60 mg: 58/1055/16-C. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika. **Datum poslední revize textu:** 25. 2. 2021. **Výdej:** Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním nebo výdejem přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou obdržíte na adrese: Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.

Určeno pro odbornou veřejnost

Zentiva, k.s., marketingové oddělení,
U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, tel.: (+420) 267 241 111, www.zentiva.cz

ZENTIVA