

STOP HLEDÁNÍ

žilní potíže |




těžké a unavené nohy
mravenčení v kůži nohou
hemoroidy



OBSAHUJE OXERUTINY
LÁTKY ROSTLINNÉHO PŮVODU

Zmírňuje příznaky žilní nedostatečnosti již do 2 týdnů




Posiluje
žilní stěnu



Snižuje
otoky



Zlepšuje krevní
oběh v nohou



Snižuje napětí, mravenčení
a svědění v nohou

www.prozdravezily.cz

Zkrácená informace o přípravku:

Venoruton 300 mg tvrdé tobolky, Venoruton Forte 500 mg tablety

Farmakoterapeutická skupina: vazoprotektivum **Složení:** jedna tobolka Venoruton obsahuje 300 mg oxerutinu (0-beta-hydroxyethyl-rutosid). Jedna tableta Venoruton Forte obsahuje 500 mg oxerutinu (0-beta-hydroxyethyl-rutosid).

Indikace: **Venoruton 300 mg:** úleva od otoků a souvisejících příznaků chronické žilní insuficience, jako jsou unavené, těžké, oteklé a bolestivé nohy, křeče, parestézie a neklidné nohy. Úleva od symptomů u hemoroidů, lymfédém a diabetická retinopatie. **Venoruton Forte 500 mg:** úleva od otoků a souvisejících příznaků chronické žilní insuficience, jako jsou unavené, těžké, oteklé a bolestivé nohy, křeče, parestézie a neklidné nohy. Úleva od symptomů u hemoroidů, lymfédém.

Dávkování a způsob podání: **Venoruton 300 mg:** **Chronická žilní insuficience a její komplikace:** 1 tobolka 3x denně. Ke zmírnění příznaků dochází obvykle během 2 týdnů. **Hemoroidy:** 1 tobolka 3x denně až po dobu 3 týdnů. **Lymfédém:** 5 tobolek 2x denně. **Diabetická retinopatie:** 4 tobolky 2x denně. **Venoruton Forte 500 mg:** **Chronická žilní insuficience a její komplikace:** 1 tableta 2x denně. Ke zmírnění příznaků dochází obvykle během 2 týdnů. **Hemoroidy:** 1 tableta 2x denně až po dobu 3 týdnů. **Lymfédém:** doporučená dávka je 3 tablety 2x denně. U obou léčivých přípravků by se mělo pokračovat ve stejném dávkování do odeznění příznaků, ne však déle než 3 měsíce. Po této době musí být léčba přehodnocena. **Způsob podání:** užívat během jídla a zapít je trochou tekutiny. **Dávkování u zvláštních populací:** **Pacienti s poruchou funkce srdce, ledvin nebo jater**-pacienti s edémy dolních končetin v důsledku onemocnění srdce, ledvin nebo jater by neměli přípravek Venoruton, Venoruton Forte užívat. **Pediatrická populace:** podávání přípravku Venoruton, Venoruton Forte u této věkové skupiny nedoporučuje (viz bod 4.4). **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku. **Upozornění:** Pacienti, kteří trpí otoky dolních končetin kvůli onemocnění srdce, ledvin nebo jater, by neměli Venoruton, Venoruton Forte užívat, jeho účinek v těchto indikacích nebyl prokázán. Bezpečnost a účinnost přípravku Venoruton, Venoruton Forte nebyla u dětí stanovena, a proto se podávání přípravku u této věkové skupiny nedoporučuje (viz bod 4.2). **Interakce:** Nebyly hlášeny žádné lékové interakce. Oxerutin nevykazoval žádnou interakci s antikoagulanty warfarinového typu. **Těhotenství a kojení:** doporučuje se, aby nebyl Venoruton, Venoruton Forte podáván v 1. trimestru gravidity. Ženám od 4. měsíce těhotenství a ženám v období kojení je možné Venoruton, Venoruton Forte podávat, avšak jenom v případech, je-li to nezbytně indikováno. **Kojící ženy** by neměly Venoruton, Venoruton Forte užívat, s výjimkou případů, kdy lékař posoudí tuto léčbu za zcela nezbytnou. **Hlavní nežádoucí účinky:** Venoruton, Venoruton Forte může v ojedinělých případech způsobit gastrointestinální nežádoucí účinky nebo kožní reakce, jako jsou poruchy gastrointestinálního traktu, nadýmání, průjem, bolest břicha, žaludeční diskomfort, dyspepsie, vyrážka, pruritus nebo kopřivka. **Zvláštní opatření pro uchování:** **Venoruton 300 mg** uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. **Venoruton Forte** nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování. **Balení na trhu:** **Venoruton 300 mg:** 50 tobolek; Venoruton Forte: 60 tablet. **Registrační číslo:** **Venoruton 300 mg:** 85/514/70-C; **Venoruton Forte:** 85/244/95-C **Datum poslední revize textu:** 24.9.2020 **Držitel rozhodnutí o registraci:** STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

Před předepsáním přípravku se seznamte s úplným souhrnem údajů o přípravku. Přípravek Venoruton 300 mg a Venoruton Forte není vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zastoupení v ČR: STADA PHARMA CZ s.r.o., Siemsenova 2717/4, 150 00 Praha 5 – Stodůlky, Tel: +420 257 888 111, www.stada-pharma.cz

