

NILEMDO[®]
(kyselina bempedoová)

NUSTENDI[®]
(kyselina bempedoová a ezetimib)

JEĎTE SI PRO SNÍŽENÍ LDL-C, ABYSTE SNÍŽILI KV RIZIKO^{1,2}

Když statiny a ezetimib nestačí, přidejte jednou denně perorálně **NILEMDO**[®] / **NUSTENDI**[®], abyste pomohli svým pacientům jít ještě dále ve snižování KV rizika.^{1,2}



Při předepisování se prosím seznamte s SPC **NILEMDO**[®] a **NUSTENDI**[®].

S KYSELINOU BEMPEDOOVOU
MĚJTE CHOLESTEROL POD KONTROLOU

ZENTIVA

 **Daiichi-Sankyo**

▼ Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlou identifikaci nových bezpečnostních informací. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Jak hlásit nežádoucí účinky viz bod 4.8 souhrnu údajů o přípravku.

Zkratky:
ASKVO: aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění;
KV: kardiovaskulární; LDL-C: lipoproteinový cholesterol s nízkou hustotou

Reference:
1. SPC přípravku Nilemdo, datum revize textu 10. 5. 2024.
2. SPC přípravku Nustendi, datum revize textu 10. 5. 2024.
3. Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J.2024; 45, 3415–3537

Určeno pro odbornou veřejnost.
ID 693714/2024/10