

Může to být akutní jaterní porfýrie?

Silná difúzní bolest břicha¹⁻³

+ 1 nebo více z následujících příznaků



**Úzkost, deprese, nespavost
nebo zmatenost¹⁻³**




**Nauzea
nebo zvracení¹⁻³**



**Hypertenze
a tachykardie¹⁻³**

**Slabost nebo bolest
končetin¹⁻³**



**Věnujte
pozornost
kombinaci
těchto
5 příznaků**

Věděli jste, že: 25 – 35 % pacientů s AJP trpí hyponaterémií³ ~90 % pacientů s příznaky jsou ženy ve věku 15 – 50 let¹

Při podezření na AJP jednejte okamžitě:

1 odeberte vzorek moči

2 chraňte před světlem

3 odešlete vzorek k otestování

AJP, Akutní jaterní porfýrie

Reference: 1. Wang B, Bonkovsky HL, Lim JK, Balwani M. *Gastroenterology*. 2023;164(3):484–491. 2. Gouya L, Ventura P, Balwani M, et al. *Hepatology*. 2020;71(5):1546–1558. 3. Ventura P, Cappellini MD, Biolcati G, et al. *Eur J Intern Med*. 2014;25(6):497–505.

Určeno pouze pro zdravotnické odborníky.

Podpořeno a financováno společností Alnylam Pharmaceuticals, Inc a Medison Pharma s.r.o.

Medison Pharma s.r.o., Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7, email: office.czech@medisonpharma.com

Všechna práva vyhrazena.

Datum přípravy: 06/2026, CZ-ALN-048-06/2026

MEDISON

 **Alnylam®**